



COVID-19 : GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE PROTECTION RESPIRATOIRE APPROPRIÉE

S'appuyant sur les recommandations générales d'autorités sanitaires de partout dans le monde, notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) et les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), AnsellCARES a élaboré ce guide pratique à l'intention des travailleurs de la santé dans les hôpitaux, les cliniques, les résidences pour personnes âgées et la communauté pour les aider à choisir une protection respiratoire appropriée.

Le tableau ci-dessous est un guide de référence rapide et n'est pas exhaustif. Veuillez consulter le mode d'emploi du fabricant ainsi que la politique et les procédures de votre établissement relativement au port de protection respiratoire.

	MASQUES MÉDICAUX		RESPIRATEURS À MASQUE FILTRANT		
					
Types de masques	Niveau 2 Protège le porteur contre les agents infectieux provenant des sécrétions du nez et de la bouche	Niveau 3 Protège le porteur contre les agents infectieux provenant des sécrétions du nez et de la bouche, contre les éclaboussures et les liquides potentiellement contaminés	N95 Filtre 95 % des matières particulaires en suspension dans l'air. L'OMS recommande d'utiliser des masques N95 ou un masque offrant une protection supérieure à 95 % lorsque des respirateurs à masque filtrant sont de mise.	N99 Filtre 99 % des matières particulaires en suspension dans l'air	N100 Protection maximale Filtre 99,7 % des matières particulaires en suspension dans l'air
Empêche la propagation de gouttelettes par le porteur	✓	✓	✓	✓	✓
Le porteur a besoin d'une protection élevée contre les éclaboussures de gouttelettes		✓	✓	✓	✓
Les projections de gouttelettes doivent être contenues et une résistance aux fluides est nécessaire			✓	✓	✓
Le porteur a besoin d'une protection respiratoire étanche et bien ajustée			✓	✓	✓
Le porteur a besoin d'une protection respiratoire étanche et bien ajustée pour les interventions médicales générant des aérosols			✓	✓	✓

IMPORTANT :

- Assurez-vous toujours de respecter la réglementation des autorités de santé publique locales en matière d'utilisation et de sélection d'EPI pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
- Suivez les directives de conservation des masques afin que les EPI soient réservés aux travailleurs de la santé en première ligne et afin d'assurer un approvisionnement suffisant d'EPI en fonction du niveau de risque.
- En plus des stratégies de conservation, les CDC ont émis des recommandations quant à l'utilisation prolongée et à la réutilisation limitée des respirateurs à masque filtrant N95. Pour réduire les contacts et les risques de transmission, une utilisation prolongée est privilégiée. Si aucun respirateur N95 n'est disponible, des respirateurs de remplacement approuvés par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) peuvent être utilisés*.

* <https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html>

COVID-19 : GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE PROTECTION RESPIRATOIRE APPROPRIÉE

Conseils importants de l'OMS relativement au port du masque* durant la pandémie de COVID-19

1

Le port d'un masque médical est l'une des mesures de prévention qui permettent de ralentir la propagation de certaines maladies respiratoires, y compris la **COVID-19**.



2



Peu importe si un masque est porté ou non, une **bonne hygiène des mains** et d'autres mesures de lutte anti-infectieuse **sont essentielles** pour éviter la transmission interhumaine.

3



Les travailleurs de la santé doivent porter un masque avec filtre à particule qui protège au moins aussi bien que le modèle **N95** certifié par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), le masque **FFP2** de l'Union européenne (UE), ou un masque équivalent, lorsque des soins sont dispensés à des cas présumés ou confirmés de COVID-19.

4



Suivre les **directives d'élimination**, qui comprennent le remplacement des masques, le retrait des masques par l'arrière et l'élimination des masques en les jetant dans des contenants fermés.

Le port d'un masque est recommandé à l'extérieur, y compris dans les transports en commun et dans les **zones densément peuplées** afin de ralentir la propagation.



* Consultez les conseils de l'OMS relativement au port du masque durant la pandémie de COVID-19. [Cliquez ici pour télécharger le document PDF.](#)

Avis de non-responsabilité : Compte tenu de la nouveauté de ce coronavirus, les recommandations émises par les sources citées sont des lignes directrices provisoires fondées sur les connaissances actuelles de la situation.