

Identificando la Alergia al látex TIPO I

Para Pacientes y Staff

La alergia al látex es una alergia a los productos hechos de látex de caucho natural.

TIPO I Reacción Inmunoglobulina E (IgE) reacción mediada por anticuerpos

- Inmediata - la reacción ocurre minutos después de la exposición
- Fase tardía - las reacciones pueden ocurrir nuevamente de 2-4 horas después de la exposición inicial

La gente con más riesgo de tener o desarrollar una alergia al látex son aquellas que tienen otras alergias

El látex y algunos alimentos contienen secuencias cortas similares de aminoácidos y son reconocidas por anticuerpos y de este modo pueden reaccionar del mismo modo

Ciertas personas tienen más riesgo de desarrollar una alergia al látex

La alergia al látex a menudo comienza con una erupción en las manos cuando se utilizan guantes de látex de caucho natural pero es entonces cuando los síntomas se pueden desarrollar

Los síntomas ocurren inmediatamente al contacto

Sufre de:

- Eczema
- Asma
- Fiebre del heno (Rinitis)
- Dermatitis

Alergia alimentaria a:

- Aguacate*
- Plátano*
- Castañas*
- Kiwi*
- Manzana
- Jitomate
- Papaya
- Papa
- Uva
- Melones
- Apio

*mayor probabilidad

Es usted:

- Trabajador de la salud
- Víctima de espina bífida
- Persona con anomalías en el tracto urinario presentes al nacer (congénitas)
- Persona que ha sufrido múltiples cirugías o procedimientos médicos
- Trabajador de la industria del caucho

Tiene signos o síntomas de:

- Cosquilleo, hinchazón, jadeos o erupciones asociadas con productos de látex:

Guantes de caucho, botellas de agua caliente, bandas elásticas, condones o una visita al dentista

Identificando la Alergia Química TIPO IV

Para Pacientes y Staff

La alergia química es una alergia a residuos químicos específicos

Reacción Alérgica de Dermatitis por Contacto TIPO IV (ACD)

No hay respuesta mediada de IgE - células T

Hipersensibilidad de tipo tardío ya que la reacción no ocurre inmediatamente


Factor de riesgo para el desarrollo de Alergia a la Proteína de Látex

Síntomas 6-48 horas después del contacto inicial

Los síntomas pueden durar hasta por 4 días

Sufre de:

- Ampollas
- Eritema
- Inflamación
- Agrietamiento
- Comezón
- Llanto
- Resequedad de la piel en el sitio



Utiliza productos que contengan:

- Glicol de Polipropileno
- Tiuram
- Carbamatos
- Mercaptobenzotiazol (MBT)
- Lanolina
- Difetilguanidina (DPG)
- Pigmentos de Color, preservativos

Identificando la Dermatitis Irritante por Contacto

Para Staff:

Esta es una condición que afecta la piel, y no es una alergia.

Dermatitis Irritante por Contacto (ICD)

Respuesta No inmune

Este tipo de dermatitis por contacto se encuentra más frecuentemente que la dermatitis alérgica por contacto

Factor de riesgo para el desarrollo de Alergia a la Proteína de Látex

Síntomas de minutos a horas después del contacto inicial

Los síntomas limitados al sitio de exposición

Sufre de:

- Enrojecimiento
- Endurecimiento
- Rozaduras
- Resequedad
- Descamación
- Agrietamiento



Está expuesto a:

- Detergentes
- Lavado frecuente de manos
- Secado inadecuado de manos
- Climas extremos
- Dermatitis pre-existente
- Técnicas agresivas de tallado
- Polvo del Guante